

使用方法

1. 使用前，洗淨雙手。
2. 將藥物栓劑外包裝去除。
3. 若只要使用半顆塞劑，可用乾淨的刀片將塞劑切半。
4. 用水溶性的潤滑劑來潤滑塞劑前端（不要使用凡士林），如果沒有水溶性的潤滑劑，可以溫水來潤濕肛門部位。
5. 身體側躺，下方腳伸直，上方的腳彎曲。
6. 另一手用手指將栓劑尖端部份插入直腸括約肌（塞劑進入的深度，小孩：約1.5公分；成人：約2.5公分）若塞入深度不足，栓劑可能會被排出。
7. 臀部向內壓幾秒鐘。
8. 維持躺下的姿勢約15分鐘，以避免塞劑跑出。
9. 將雙手洗淨。

注意事項

1. 肛門使用的製劑不可用於身體其他部位。
2. 若病情持續或更糟，或感到以前沒有過的肛門不舒服（如燒灼或刺激感），要儘快讓醫師、藥師知道。

儲存方式

1. 除有特別指示，請於室溫陰涼乾燥處避光儲存。若使用說明有特別註明要冷藏則要依說明來儲存。
2. 放在孩童不易取得的場所。



如何正確使用 肛門栓劑



Tel : 04-7229889

諮詢專線：04-7229886

院址：彰化市光復路53號

網址：www.sanannh.com.tw



Sanannhospital