

使用方法

使用前，洗淨雙手



將藥物栓劑外包裝去除



最好戴上手套，以免污染藥品



可將栓劑迅速以溫水通過濕潤以利塞入陰道內。若使用給藥器，可將栓劑放入給藥器前端。




採蹲姿或內診時的姿勢，輕輕用手或給藥器前端伸入陰道，約1-2指節深。



在給藥完全後，保持給藥器壓緊的狀況，將給藥器抽出。

注意事項

1. 藥物要連續使用，直到用完。在月經期仍要使用力不可擅自中斷。
2. 若感到陰道不舒適（如燒灼或刺激感）要儘早讓醫師知道。
3. 應避免性交或請男性帶保險套，以防止再感染。
4. 每次使用完畢後，將給藥器分開並用肥皂及溫水清洗。沖洗乾淨後擦乾再組給起來。
5. 藥車在陰道內，會慢慢溶解而且會有粘稠或水液狀的液體分泌物排出，乃屬正常現象，勿立即進行陰道之沖洗。
6. 睡覺前使用，可使藥品停留在陰道的時間延長而提高療效。
7. 為避免重複感染及避免在衣褲上污染，對陰道口清潔，最好用紙巾或棉墊而不是用棉花。
8. 孕婦不可用陰道送藥器，以避免刺激陰道導致子宮收縮而流產。



儲存方式

1. 除有特別指示，請於室溫陰涼乾燥處避光儲存。若使用說明有特別註明要冷藏則要依說明來儲存。
2. 放在孩童不易取得的場所。



如何正確使用 陰道栓劑



Tel : 04-7229889

諮詢專線：04-7229886

院址：彰化市光復路53號

網址：www.sanannh.com.tw

